

Implante hormonal

Conoce más sobre este método anticonceptivo

ORGANON

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida



Características del método

99,95 % **Acción anticonceptiva**

3 años **Uso**

Subcutánea **Vía de administración**

 **Protección frente a ITS**

Perfiles de mujeres

en los que es adecuado el método



Lactancia



Tabaquismo



Obesidad



Nulíparas



Migrañas



Hipertensión

¿Qué es?

El implante es un método anticonceptivo reversible de larga duración (LARC). Es una pequeña varilla de plástico, blanda, y flexible que libera una pequeña cantidad de progestágeno diariamente y se presenta precargado en un aplicador estéril desechable. Este método te puede **proteger del embarazo** durante un periodo de hasta tres años.

0,05 de cada 100 mujeres sufrieron un embarazo no deseado durante el primer año de utilización del anticonceptivo con el **uso típico*** (uso real, que incluye el uso inconsistente o incorrecto) del método y **0,05 de cada 100 mujeres** con el **uso perfecto** (utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso).

¿Cómo actúa?

El principio activo, **etonogestrel** actúa de dos formas:

- Impide la liberación de un óvulo de los ovarios.
- Produce cambios en el cérvix que dificultan la entrada del semen en el útero.

¿Cómo se usa?

El implante debe ser **insertado y extraído únicamente por un profesional sanitario** que esté formado en el proceso de inserción y extracción.

El profesional sanitario decidirá contigo el momento más adecuado para la inserción. Esto depende de tu situación personal (por ejemplo, el método anticonceptivo que estás utilizando en la actualidad). A menos que cambies desde otro método anticonceptivo hormonal, **la inserción** se realizará los **días 1-5 de tu sangrado menstrual espontáneo**, para descartar un embarazo.


Antes de insertar o extraer el implante se te administrará anestesia local. El implante se inserta justo **bajo la piel**, en la **cara interna de la parte superior del brazo no dominante** (el que no utilizas para escribir).



*No se recomienda utilizar el método anticonceptivo de forma distinta a la descrita en las instrucciones de uso.

Implante hormonal

Conoce más sobre este método anticonceptivo



 ORGANON

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida

Tanto el profesional sanitario como tú, debéis ser capaces de palpar y notar el implante bajo la piel después de su colocación.

Si no puedes palpar el implante inmediatamente después de la inserción, o en cualquier momento, puede que el implante no haya sido insertado o puede que haya sido insertado profundamente. Si tienes la más mínima duda, deberás usar un método anticonceptivo de barrera (por ejemplo, un preservativo) hasta que tu profesional sanitario y tú estéis completamente seguros de que el implante está insertado.

El implante debe extraerse o sustituirse antes de que pasen 3 años desde la inserción. Si deseas continuar usando el mismo método, se te podrá insertar en ese mismo momento un nuevo implante. Puedes pedirle a tu médico que te extraiga el implante en cualquier momento.

¿Quién puede utilizarlo?


- Mujeres que hayan tenido o no hijos.
- Mujeres de entre 18 y 40 años.
- Mujeres que han sufrido un aborto o un aborto espontáneo (en el plazo de los 5 días siguientes al aborto durante el primer trimestre del embarazo, y entre los días 21 y 28 en el segundo trimestre).
- Mujeres fumadoras de más de 35 años (hasta 40 años).
- Mujeres que padecen migraña con aura.
- Mujeres con obesidad.
- Mujeres que no pueden tomar estrógenos.
- Madres en periodo de lactancia (tras la cuarta semana postparto).
- Mujeres que tienen o han tenido anemia.

Ventajas

- Es un método reversible.
- Ofrece protección a largo plazo.
- Es un método discreto.
- No requiere administración diaria.
- No interfiere en tus relaciones sexuales.
- No se ve afectado en caso de vómitos y/o diarrea, ni con el uso de antibióticos comunes.
- Puedes solicitar que un médico te extraiga el implante en el momento que lo desees.

Implante hormonal

Conoce más sobre este método anticonceptivo



 ORGANON

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida

Advertencias y precauciones

El implante no te protege frente a las infecciones de transmisión sexual (ITS) ni frente a la infección por VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana).

No utilices un implante como método anticonceptivo si:


- Eres alérgica al principio activo o a alguno de los demás componentes de este medicamento.
- Sufres trombosis (coágulo de sangre en un vaso sanguíneo, por trombosis venosa profunda o embolia pulmonar).
- Padeces o tienes antecedentes de alteraciones hepáticas graves (hasta que los valores de la función hepática no se hayan normalizado).
- Has tenido cáncer de mama o de los órganos genitales o hay sospechas de que pudieras tenerlo.
- Tienes sangrados vaginales sin causa justificada.

Embarazo y lactancia

No utilices el implante si estás embarazada o sospechas que puedes estarlo. Si tienes dudas sobre si estás embarazada deberás hacerte un test de embarazo antes de que te inserten el implante.

El implante puede utilizarse durante el periodo de lactancia. Aunque una pequeña cantidad del principio activo del implante pasa a la leche materna, no afecta a la producción o a la calidad de la leche materna, ni al crecimiento ni el desarrollo de los niños.

Si estás en período de lactancia, consulta a tu médico antes de utilizar este medicamento.



Cambios en el patrón de sangrado menstrual


Al igual que con otros anticonceptivos que sólo contienen progestágeno, el patrón de tu sangrado menstrual puede cambiar durante el uso del implante. Puedes experimentar cambios en la frecuencia del sangrado (ausencia, disminución, sangrados más frecuentes o continuos), en la intensidad (disminución o aumento), o en la duración. 1 de cada 5 mujeres no tienen sangrado mientras que 1 de cada 5 mujeres experimentan sangrados frecuentes y/o prolongados. Ocasionalmente se han comunicado casos de sangrado intenso. Tu patrón de sangrado durante los tres primeros meses generalmente indica tu futuro patrón de sangrado.

Un cambio en el patrón de sangrado no significa que el implante no sea adecuado para ti o que no te proteja del embarazo. En general, no es necesario que tomes ninguna medida. Debes consultar a tu médico si el sangrado menstrual es intenso o prolongado.

Cuando el implante es retirado, el periodo vuelve a la normalidad.

Implante hormonal

Conoce más sobre este método anticonceptivo



 ORGANON

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida

Uso del implante con otros medicamentos

Informa siempre a tu médico sobre qué medicamentos o plantas medicinales estás utilizando.

Algunos medicamentos:

- Pueden tener una influencia en los niveles de la hormona (progestágeno) en sangre.
- Pueden hacer que sea menos efectivo en la prevención del embarazo.
- Pueden causar sangrados inesperados.

Posibles efectos adversos

Si experimentas cualquier tipo de efecto adverso, consulta a tu médico, farmacéutico o enfermero.

Los efectos adversos muy frecuentes que pueden afectar a más de 1 de cada 10 mujeres son:

- Acné.
- Dolor de cabeza.
- Aumento del peso corporal.
- Dolor en las mamas.
- Sangrado irregular.
- Infección en la vagina.

**El contenido que se proporciona en esta literatura es información general.
En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de tu médico.**