

El implante es un método anticonceptivo hormonal de larga duración que puede proteger de embarazos durante tres años

Como ocurre con otros anticonceptivos de sólo progestágeno, el patrón de sangrado menstrual puede experimentar cambios con el uso del implante.

Cambios en el ciclo menstrual



1 de cada 5 mujeres sin sangrado




1 de cada 5 mujeres puede presentar sangrados frecuentes y/o prolongados

La alteración en el patrón de sangrado no significa que el implante no sea adecuado para ti o que no te proteja del embarazo.

- En general, no es necesario que hagas nada ante estos cambios. Deberías consultar con tu médico si tu sangrado menstrual es intenso o prolongado.
- Tu patrón de sangrado de los tres primeros meses generalmente puede predecir los futuros patrones.
- Es importante que le des tiempo a tu cuerpo para que se acostumbre a este método anticonceptivo.
 - Las mujeres con un patrón de sangrado desfavorable en los 3 primeros meses tuvieron una probabilidad del 50% de que este pudiera mejorar.
 - Las mujeres con patrón de sangrado favorable mostraron una tendencia de continuar con este patrón durante los dos primeros años de uso del implante, mientras que las mujeres con patrón de sangrado desfavorable tuvieron al menos un 50% de probabilidad de que el patrón mejorara posteriormente.
- Después de la retirada del implante, el retorno a los ciclos menstruales normales es rápido.


Anota en este calendario tus periodos de sangrado

¿Cómo sé si mi nivel de sangrado debe clasificarse como ligero, regular o intenso?




Sangrado ligero

Sangrado ligero o suave, menos que un período y posiblemente solo advertido como una gotita de sangre en la ropa interior o al limpiarse



Sangrado regular

Nivel de sangrado que esperaría tener durante su período normal



Sangrado intenso

Un número inusualmente elevado de compresas o tampones para tratar el flujo de sangre o experimentar una inundación a través del producto sanitario o la ropa.

Mes 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Mes 2																																
Mes 3																																
Mes 4																																
Mes 5																																
Mes 6																																

El contenido que se proporciona en esta literatura es información general dirigida a usuarias del implante mayores de 18 años. En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de su médico.